


CENTRO DEL DOLOR EMORY

Procedimiento con parche hemético

¿Qué es un parche hemético? Un parche hemético es un procedimiento médico que se usa para tratar una fuga de líquido cefalorraquídeo (LCR) en la columna vertebral. Implica inyectar una pequeña cantidad de la propia sangre del paciente en el espacio epidural, que es la parte más externa del canal espinal. La sangre forma un coágulo que sella la fuga y ayuda a restaurar la presión normal del LCR.



¿Por qué se realiza un parche hemético? Se realiza un parche hemético para aliviar los síntomas asociados con una fuga de LCR. Las fugas de LCR pueden ocurrir espontáneamente o como una complicación de ciertos procedimientos médicos, como una punción lumbar o anestesia epidural. Los síntomas de una fuga de LCR pueden incluir dolor de cabeza intenso, dolor de cuello, náuseas, sensibilidad a la luz, y cambios en la audición o la visión. Un parche de sangre ayuda a aliviar estos síntomas al sellar la fuga y restaurar la presión normal del LCR.

¿Cómo se realiza un parche hemético? Un procedimiento de parche hemético generalmente se realiza como un procedimiento ambulatorio. Usted estará posicionado de una manera que permita al médico acceder al área donde se realizará el parche hemético. La piel alrededor del sitio de la inyección se limpiará con una solución antiséptica. Se extraerá una pequeña cantidad de sangre del brazo y se inyectará en el espacio epidural cerca del sitio de la fuga del líquido cefalorraquídeo. La inyección se guía por técnicas de imagen, como fluoroscopia o ultrasonido, para asegurar la colocación precisa de la aguja. La sangre forma un coágulo que sella la fuga. El procedimiento suele durar entre 30 minutos y una hora.

¿Qué debo esperar durante un procedimiento de parche hemético? Antes del procedimiento, se le puede pedir que no coma ni beba durante un cierto período de tiempo. Se puede insertar una vía intravenosa (IV) para proporcionar líquidos o medicamentos, si es necesario. El lugar de la inyección se puede adormecer con un anestésico local para

El número telefónico de la clínica es 404-686-2410

minimizar las molestias durante el procedimiento. Usted estará despierto durante el procedimiento del parche hemético, y puede sentir presión o sensación de calor a medida que se inyecta la sangre. Lo monitorearemos minuciosamente después del procedimiento para asegurarnos de que no haya complicaciones inmediatas.

¿Cuáles son los efectos secundarios/riesgos de un parche hemético? Los procedimientos de parches heméticos generalmente son seguros, pero como cualquier procedimiento médico, conllevan algunos riesgos. Los efectos secundarios comunes pueden incluir molestias temporales o dolor en el lugar de la inyección, moretones o sangrado leve. En casos raros, puede ocurrir infección, reacciones alérgicas, daño a los nervios o una recurrencia de los síntomas. Es importante discutir cualquier inquietud o complicación potencial con su proveedor de atención médica antes del procedimiento.

¿Qué debo esperar después de un procedimiento de parche hemético? Después del parche hemético, puede experimentar un alivio inmediato de los síntomas asociados con la fuga del LCR. Es común tener algún dolor residual o dolor en el sitio de la inyección, que debe mejorar con el tiempo. Su proveedor de atención médica puede proporcionarle instrucciones específicas con respecto a las restricciones de actividad o cualquier medicamento que tome durante el período de recuperación. Es importante informarle a su proveedor de atención médica de cualquier síntoma nuevo o que empeora.